


FUNDLISTE

Die folgende Fundliste enthält den lateinischen und den deutschen Namen der Flechte sowie die Nummern des Sektors, in dem die Flechte angetroffen wurde (siehe Grafik auf dieser Seite rechts).

Für die nun folgenden Flechtenportraits (blau markiert) sind die jeweiligen Seitenzahlen in der Spalte ganz rechts aufgeführt.

Der vollumfängliche Datensatz zu den Flechtenfunden findet sich als .xls-Tabelle zum Download bereit:

[www.flechten-kaufmann.ch /](http://www.flechten-kaufmann.ch/)
[Flechtenwelt Halbinsel Chastè / Fundlisten](#)



Sektoren Fundorte

Legende zu den Ecotypen:

e: epiphytisch (baumbewohnend) m: muscicolen (moosbewohnend) l: lignicol (totholzbewohnend)
t: terricol (erdbewohnend) s: saxicol (gesteinsbewohnend)

Lateinischer Name	Deutscher Name	Sektoren	Ecotyp
<i>Acarospora fuscata</i> (Schr.) Th. Fr.	Gewöhnliche Kleinsporflechte	7	s
<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Körb.	Gefranste Wimpernflechte	3+7	s
<i>Arthonia mediella</i> Nyl.	Mittlere Fleckflechte	1+5+4	e
<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.	Strahlige Fleckflechte	2+3+5	e
<i>Aspicilia cinerea</i> (L.) Körb.	Graue Kragenflechte	3	s
<i>Bacidia subincompta</i> (Nyl.) Arnold	Einfache Stäbchenflechte	7	e
<i>Brodoa intestiniiformis</i> (Vill.) Goward	Eingeweideflechte	1+2+6+7	s
<i>Bryoria capillaris</i> (Ach.) Brodo & D. Hawksw.	Haarfeiner Moosbart	3+5	e
<i>Bryoria fuscensens</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	Brauner Moosbart	5+7	e
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw.	Verschlungener Moosbart	3+4+5+9	e
<i>Bryoria pseudofuscens</i> (Gyeln.) B. & D. H.		3	e
<i>Buellia griseovirens</i> (Sm.) Almb.	Graugrüne Schwarzpunktflechte	1	e
<i>Buellia punctata</i> (Hoffm.) A. Massal.	Pünckchenflechte	1+4+7	e
<i>Buellia schaereri</i> De Not.	Schärers Schwarzpunktflechte	8+9	e
<i>Calicium trabinellum</i> (Ach.) Ach.	Gelbe Kelchflechte	3	e
<i>Calicium viride</i> Pers.	Grüne Kelchflechte	9	e
<i>Caloplaca arenaria</i> (Pers.) Müll. Arg.		3+8+7	s
<i>Caloplaca cerinelloides</i> (Erichsen) Poelt		5	e
<i>Caloplaca cirrochroa</i> (Ach.) Th. Fr.		3	s
<i>Caloplaca flavovirescens</i> (Wulfen) <i>Dalla Torre & Sarrnth.</i>		8	s
<i>Candelariella coralliza</i> (Nyl.) H. Magn.	Korallen-Dotterflechte	2+7	s

Lateinischer Name	Deutscher Name	Sektoren	Ecotyp
<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau	Sorediöse Dotterflechte	1+2	e
<i>Candelariella vitellina</i> (Hoffm.) Müll. Arg.	Gewöhnliche Dotterflechte	1+4+6+7+9	s
<i>Candelariella xanthostigma</i> (Ach.) Lettau	Körnige Dotterflechte	1+3+6	e
<i>Cetraria aculeata</i> (Schreb.) Fr.	Stachel-Hornflechte	7	s
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. subsp. <i>islandica</i>	Isländisch Moos	1+5+8	e
<i>Cetraria islandica</i> subsp. <i>crispiformis</i> (Räsänen) K.t	Isländisch Moos	1	s
<i>Chaenotheca chrysocephala</i> (Ach.) Th. Fr.	Goldgelbe Stecknadel	3	e
<i>Chaenotheca stemonea</i> (Ach.) Müll. Arg.	Fädige Stecknadel	7	e
<i>Chaenotheca trichialis</i> (Ach.) Th. Fr.	Haarfeine Stecknade	3	e
<i>Chaenotheca furfuracea</i> L. Tibeli	Kleiige Stecknadel	3+5+6+7	e
<i>Chrysotrix chlorina</i> (Ach.) J.R. Laundon	Fels-Schwefelflechte	2+3	s
<i>Cladonia arbuscula</i> subsp. <i>mitis</i> (Sandst.) R.	Sparrige Rentierflechte	6+8	s
<i>Cladonia arbuscula</i> subsp. <i>squarrosa</i> (Wallr.) R.	Wald-Rentierflechte	5+8	m
<i>Cladonia borealis</i> S. Stenroos	Nordische Scharlachflechte	5	s
<i>Cladonia cenotea</i> (Ach.) Schaer.	Hakenförmige Säulenflechte	2+3+5	m
<i>Cladonia chlorophaea</i> (Sommerf.) Spreng.		3+7+8	s
<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	Gewöhnliche Säulenflechte	1	e
<i>Cladonia deformis</i> (L.) Hoffm.	Ungestalte Scharlachflechte	6	t
<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.	Finger-Scharlachflechte	1+2+7+9	e
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) subsp. <i>furcata</i>	Gabel-Säulenflechte	6	m
<i>Cladonia glauca</i> Flörke	Blaugüne Säulenflechte	2	l
<i>Cladonia macrophylla</i> (Schaer.) Stenb.	Großblättrige Becherflechte	2+5	m
<i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer.	Gewöhnliche Scharlachflechte	1+3+5+6+7+9	e
<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	Gewöhnliche Becherflechte	6+7+8	s
<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm. var. <i>squamosa</i>	Schuppige Säulenflechte	2+3	m
<i>Cladonia strepsilis</i> (Ach.) Grognot	Aufsteigende Schuppenflechte	8	m
<i>Cladonia symphylicarpa</i> (Flörke) Fr.	Aufgebogene Becherflechte	8	m
<i>Cladonia uncialis</i> (L.) F. H. Wigg. subsp. <i>uncialis</i>	Igel-Säulenflechte	8	m
<i>Collema flaccidum</i> (Ach.) Ach.	Welke Leimflechte	5	s
<i>Cyphelium tigillare</i> (Ach.) Ach.	Gelbe Staubfruchtflechte	8	e
<i>Cystocoleus ebeneus</i> (Dillwyn) Thwaites	Gewöhnlicher Schwarzfilz	2	m
<i>Dimelaena oreina</i> (Ach.) Norman	Schwarzfrüchtige Bergflechte	7	s
<i>Diploschistes scruposus</i> (Schreb.) Norman	Raue Krugflechte	3	s
<i>Diplotomma alboatrum</i> (Hoffm.) Flot.	Schwarzweiße Scheibenflechte	3	s
<i>Evernia mesomorpha</i> Nyl.	Mittlere Pflaumenflechte	7	e
<i>Flavocetraria cucullata</i> (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell	Kapuzen-Gelbhornflechte	5+6	t
<i>Frutidella pullata</i> (Norman) Schmuell	Dunkle Schwarznapfflechte	1+9	e
<i>Hypocnomyce friesii</i> (Ach.) P. J. & G. S.	Holz-Schuppenflechte	3	e
<i>Hypocnomyce scalaris</i> (Ach.) M. Choisy	Aufsteigende Schuppenflechte	1+3+4+5+7+8+9	e
<i>Hypogymnia bitteri</i> (Lyng.) Abti	Bitters Blasenflechte	2	s
<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	Gewöhnliche Blasenflechte	1+2+3+4+5+9+10	e

Lateinischer Name	Deutscher Name	Sektoren	Ecotyp
<i>Imshaugia aleurites</i> (Ach.) S.F.Meyer	Körnige Napfflechte	7	e
<i>Lecanora boligera</i> (Th. Fr.) Hedl.		1	e
<i>Lecanora carpinea</i> (L.) Vain.	Hainbuchen-Kuchenflechte	5	e
<i>Lecanora cenisia</i> Ach.	Rauchige Kuchenflechte	2+7+8	s
<i>Lecanora chlarotera</i> Nyl.	Helle Kuchenflechte	1+4+5+7	e
<i>Lecanora crenulata</i> Hook.	Gekerbte Kuchenflechte	1	s
<i>Lecanora expansa</i> Nyl.	Fleckmehlige Kuchenflechte	1+4+7	e
<i>Lecanora farinaria</i> Borrer		3	e
<i>Lecanora leptyroides</i> (Nyl.) Degel.	Hainbuchen-Kuchenflechte	1+2+3+5+6	e
<i>Lecanora polytropia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.	Vielgestaltige Kuchenflechte	1	s
<i>Lecanora pulicaris</i> (Pers.) Ach.	Floh-Kuchenflechte	3+7	e
<i>Lecanora rupicola</i> (L.) Zahlbr. subsp. subplanata (Nyl.) Leuckert & Poelt	Fels-Kuchenflechte	3	s
<i>Lecanora saligna</i> (Schräd.) Zahlbr.	Weiden-Kuchenflechte	3	l
<i>Lecanora saxicola</i> (Pollich) Ach.	Alpenzwergstrauch-Kuchenflechte	2+8+9	s
<i>Lecanora varia</i> (Hoffm.) Ach.	Veränderliche Kuchenflechte	7	l
<i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. C. var. <i>Elaeoc.</i>	Olivgrüne Schwarznapfflechte	3+5+6	e
<i>Lecidella flavosorediata</i> (Vězda) Hertel & Leuckert	Gelbmehlige Schwarznapfflechte	7	e
<i>Lecidella leprothalla</i> aff. (Zahlbr.) Knoph & L.		6	e
<i>Lepraria borealis</i> Lohlander & Tønsberg	Grobkörnige Staufflechte	2+8	m
<i>Lepraria elobata</i> Tønsberg	Graue Staufflechte	2+4+3	e
<i>Lepraria incana</i> (L.) Ach.	Graue Staufflechte	1+3+4+5+5	e
<i>Lepraria jackii</i> Tønsberg	Jacks Staufflechte	2+5	e
<i>Lepraria lobificans</i> Nyl.		2+7	e
<i>Lepraria rigidula</i> (B. de Lesd.) Tønsberg	Zottelige Staufflechte	1+2+3+4+8	e
<i>Leprocaulon microscopicum</i> (Vill.) Gams	Spangrüne Korallenflechte	5+8+7	t
<i>Leptochidium albociliatum</i> (Desm.) M. Choisy		8	m
<i>Leptogium teretiusculum</i> (Wallr.) Arnold	Stiftchen-Gallertflechte	8	t
<i>Letharia vulpina</i> (L.) Hue	Wolfsflechte	Alle Sektoren	e
<i>Lichenomphalia</i> sp.	Hufflechte	2	l
<i>Massalongia carnosa</i> (Dicks.) Körb.	Körnige Fleischflechte	8	m
<i>Melanelia hepatizon</i> (Ach.) A. Thell	Rinnige Braunschüsselflechte	2	s
<i>Melanelixia fuliginosa</i> (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch	Samtige Braunschüsselflechte	3	s
<i>Melanelixia glabrata</i> (Lamy) Sandler & Arup	Gewöhnliche Braunschüsselflechte	3	s
<i>Melanobalea exasperatula</i> (Nyl.) O. Blanco et al.	Raue Braunschüsselflechte	1+2+4+5+6+8+9	e
<i>Micarea denigrata</i> (Fr.) Hedl.	Geschwärzte Krümflechte	1	e
<i>Montanelia disjuncta</i> (Erichsen) Divakar et al.	Zerstreute Braunschüsselflechte	7	s
<i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.	Sorediöse Nierenflechte	5+8	m
<i>Ochrolechia alboflavescens</i> (Wulfen) Zahlbr.	Weißgelbe Cremeflechte	1+2+3+4+5+6+8+9	e
<i>Ochrolechia androgyna</i> (Hoffm.) Arnold	Zwittrige Cremeflechte	2	e
<i>Ochrolechia arborea</i> (Kreyer) Almb.	Baum-Cremeflechte	6	e

Lateinischer Name	Deutscher Name	Sektoren	Ecotyp
<i>Ochrolechia babusiensis</i> H. Magn.	Nordische Cremeflechte	9	e
<i>Ophioparma ventosa</i> (L.) Norman	Blutaugenflechte	3	s
<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) Ach.	Nabelartige Schüsselflechte	4	s
<i>Parmelia omphalodes</i> subsp. <i>Pinnatifida</i>	Nabelartige Schüsselflechte	2	s
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	Felsen-Schüsselflechte	Alle Sektoren	s
<i>Parmelia squarrosa</i> Hale		1+7+10	s
<i>Parmelia sulcata</i> Taylor	Furchen-Schüsselflechte	1+2+3+5+7+8	e
<i>Parmelina tiliacea</i> (Hoffm.) Hale	Linden-Schüsselflechte	7	s
<i>Parmeliopsis ambigua</i> (Wulfen) Nyl.	Wechselhafte Napfflechte	Alle Sektoren	e
<i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold	Übersehene Napfflechte	3	l
<i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.	Hügel-Schildflechte	5	e
<i>Peltigera didactyla</i> (With.) J.R. Laundon	Zwerg-Schildflechte	8	t
<i>Peltigera elisabethae</i> Gyeln	Elisabeths Schildfelchte	5	m
<i>Peltigera leucophlebia</i> (Nyl.) Gyeln.	Adrige Apfelflechte	8	m
<i>Peltigera polydactylon</i> (Neck.) Hoffm.	Vielfingerige Schildflechte	4	m
<i>Peltigera rufescens</i> (Weiss) Humb.	Bereifte Schildflechte	5	m
<i>Pertusaria amarescens</i> Nyl.		8	s
<i>Pertusaria corallina</i> (L.) Arnold	Korallen-Porenflechte	7+8	s
<i>Pertusaria lactea</i> (L.) Arnold		8	s
<i>Physcia caesia</i> (Hoffm.) Fürnr.	Blaugraue Schwielenflechte	9	s
<i>Physcia dubia</i> (Hoffm.) Lettau	Zweifelhafte Schwielenflechte	9	s
<i>Physconia muscigena</i> (Ach.) Poelt	Moos-Raureifflechte	7+8+9	m
<i>Physconia perisidiosa</i> (Erichsen) Moberg	Violette Raureifflechte	3	s
<i>Placynthiella dasaea</i> (Stirt.) Tønsberg	Feine Schwarznappflechte	10	e
<i>Placynthiella icmalea</i> (Ach.) Coppins & P. J.	Korallen-Schwarznappflechte	1+3+5	e
<i>Pleopsidium chlorophanum</i> (Wahlenb.) Zopf	Grüngelber Felsenfleck	6+7	s
<i>Pleopsidium flavum</i> (Bellardi) Körb.	Gelber Felsenfleck	7	s
<i>Polysporina simplex</i> (Davies) Vězda	Einfacher Vielsporer	8	s
<i>Protoparmelia badia</i> (Hoffm.) Hafellner	Braune Urschüsselflechte	3	s
<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf	Elchgeweihflechte	1+2	e
<i>Pseudevernia furfuracea</i> s.l. (L.) Zopf	Elchgeweihflechte	1+2+3+4+7	e
<i>Pseudevernia furfuracea</i> var. <i>ceratea</i> (Ach.).	Elchgeweihflechte	1+2+4+5+8+10	e
<i>Pycnora sorophora</i> (Vain.) Hafellner	Versteckte Holzkruste	7	l
<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Mehlige Astflechte	1+2	e
<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	Staubige Astflechte	6	s
<i>Rhizocarpon badioatrum</i> (Spreng.) Th. Fr.	Braune Landkartenflechte	3	s
<i>Rhizocarpon geographicum</i> s.l. (L.) DC.	Gewöhnliche Landkartenflechte	1+2+8+7+8	s
<i>Rinodina conradii</i> Körb.	Conrads Braunsporflechte	3	l
<i>Rinodina exigua</i> (Ach.) Gray	Kleine Braunsporflechte	3	l
<i>Rinodina pyrina</i> (Ach.) Arnold	Birnen-Braunsporflechte	3+7	l
<i>Sclerococcum sphaerale</i> Fr.		7	s
<i>Scoliciosporum umbrinum</i> (Ach.) Arnold	Braune Krummsporflechte	1+6	e

Lateinischer Name	Deutscher Name	Sektoren	Ecotyp
<i>Sphaerophorus fragilis</i> (L.) Pers.	Zerbrechlicher Kugelträger	6	s
<i>Sphaerophorus globosus</i> (Huds.) Vain.	Korallen-Kugelträger	2	s
<i>Stereocaulon alpinum</i> Laurer	Alpine Korallenfelchte	5	m
<i>Strangospora moriformis</i> (Ach.) Stein	Maulbeer-Rundsporflechte	6+7	e
<i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner var. <i>atra</i>	Schwarze Kuchenflechte	6	e
<i>Thamnolia vermicularis</i> s.l.	Totengebein	2	t
<i>Toninia squalida</i> (Ach.) A. Massal.	Schuppige Blasenkruste	8	t
<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins & P. James	Blaugrüner Krustenfleck	3+5	e
<i>Trapeliopsis gelatinosa</i> (Flörke) Coppins & P. James	Gelatinöser Krustenfleck	6	t
<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	Körniger Krustenfleck	3	l
<i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.) Hale	Braungrüne Moosflechte	3+5	e
<i>Umbilicaria cinereorufescens</i> (Schaer.) Frey	Graubraune Nabelflechte	1+2	s
<i>Umbilicaria crustulosa</i> (Ach.) Frey	Sickerwasser-Nabelflechte	1+2+3+6+7+9	s
<i>Umbilicaria cylindrica</i> (L.) Del. ex Duby	Fransen-Nabelflechte	2+7	s
<i>Umbilicaria deusta</i> (L.) Baumg.	Rußige Nabelflechte	1+2+6+7	s
<i>Umbilicaria hirsuta</i> (Westr.) Hoffm.	Zottige Nabelflechte	1+2+6+7+9	s
<i>Umbilicaria polyphylla</i> (L.) Baumg.	Vielblättrige Nabelflechte	2+7	s
<i>Umbilicaria polyyrrhiza</i> (L.) Fr.	Rhizenreiche Nabelflechte	8	s
<i>Umbilicaria vellea</i> (L.) Hoffm.	Große Nabelflechte	1+5+6+7+8	s
<i>Usnea barbata</i> (L.) F. H. Wigg.	Echte Bartflechte	1+2+5+7+8	e
<i>Usnea dasypoga</i> (Ach.) Nyl.	Gewöhnliche Bartflechte	10	e
<i>Usnea hirta</i> (L.) F.H.Wigg. nom. cons.	Struppige Bartflechte	Alle Sektoren	e
<i>Usnea substerilis</i> / <i>U. lapponica</i>	Verbogene Bartflechte	2	e
<i>Usnea substerilis</i> Motyka	Verbogene Bartflechte	1+5	e
<i>Usnea viktoriana</i> P. Clerc & Otte		5	e
<i>Vulpicida pinastri</i> s.l.	Kiefer-Fuchstöter, Wolfstöter	1+2+3+4+7	e
<i>Xanthoparmelia conspersa</i> (Ach.) Hale	Gesprenkelte Felsschüsselflechte	1+7+8	s
<i>Xanthoparmelia loxodes</i> (Nyl.) O. Blanco & et al.	Grobwarzige Felsschüsselflechte	7+8	s
<i>Xanthoparmelia stenophylla</i> (Ach.) A. & D. H.	Schmalblättrige Felsschüsselflechte	1+7	s
<i>Xanthoria candelaria</i> (L.) Th. Fr.	Korallen-Gelbflechte	1+6+8	e
<i>Xanthoria elegans</i> (Link) Th. Fr.	Zierliche Gelbflechte	1+7+8+9	s
<i>Xanthoria polycarpa</i> (Hoffm.) Rieber	Vielfruchtige Gelbflechte	2+6	e
<i>Xanthoria ucrainica</i> S. Y. Kondr.		1+4+5+6+8	e
<i>Xanthoria ulophyllodes</i> Räsänen		7	e